# AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE L'ESTALLE DE L'ALLES DE L'ALLES

BULLETIN **TECHNIQUE** STATIONS **D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES** 

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuvillette, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43 - 09.27.46

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture à Châlons-sur-Marne

BULLETIN Nº 27 du 23 Septembre 1982

Edition Grandes Cultures

Envoi nº 23

COLZA

es chilisables en postalevée sont essentiellement des ant Levées très irrégulières, toutefois plus satisfaisantes en terre blanche qu'en terre colorée. Les récentes pluies devraient dans une certaine mesure améliorer cette situation. Normalement les levées actuelles peuvent encore arriver à un stade de bonne résistance au gel (4-6 feuilles) avant le début de l'hiver.


#### Altise

Premières captures de grosse altise dans le courant de la semaine passée. Présence fréquente de morsures sur feuilles et cotylédons. La sécheresse persistante a ralenti l'activité des traitements de semence ou des protections réalisées au sol. Les récentes pluies devraient régulariser l'action de ces derniers.


En l'absence de protection microgranulés au sol :

Surveillez vos parcelles, sur les cultures présentant une levée suffisante, intervenir dès que l'on observe deux plantes sur trois avec au moins une morsure.

pré ou de post-semis notamment sur infertitons de repousses de céréales.



Altise adulte



Morsures sur jeune plantule

Les pyréthrinoïdes de synthèse donnent de bons résultats, grâce à une meilleure rémanence qui est intéressante notamment dans le cas de vols échelonnés :

- cyperméthrine : Ripcord 5 à 0,4 1/ha Cymbush à 0,25 1/ha Kafil super à 0,25 1/ha
- deltaméthrine : Decis à 0,3 1/ha
- fenvalérate : Sumicidin à 0,5 1/ha

on Champagne-Ardene. Le Directeur Cérant J. SONER

The Prot W sassin do Presse N 529 AD

#### Tenthrède

Ce ravageur est signalé sur quelques parcelles. La chenille est noirâtre avec une bande grise sur le côté. Elle provoque des <u>dégâts sur feuilles</u>. Dans les cas d'attaques importantes utiliser un parathion à 350 g de matière active par ha.

#### Limace

Surveillez l'activité de ce ravageur car les dégâts peuvent intervenir très tôt.

Les attaques se manifestent d'abord sur les bordures ou les parties les plus motteuses. Pour estimer les populations disposer des granulés sous des abris. Dès la présence de nombreux cadavres intervenir avec une spécialité à base de métaldéhyde ou avec Mesurol anti-limace.

### Désherbage en post-levée

Les herbicides utilisables en post-levée sont essentiellement des anti-graminées. Seul le Kerb ultra présente une efficacité sur certaines dicotylédones (stellaires, sanves...).

Le désherbage de post-levée est souvent employé en complément du désherbage de pré ou de post-semis notamment sur infestations de repousses de céréales.

REPONDEUR AVERTISSEMENTS (26) 87.40.78

Imprimerie de la Circonscription Champagne-Ardenne. Le Directeur Gérant J. SONDEY Commission Paritaire de Presse N 529 AD

- opperately a sipport I a o.4 l/be - Cymbuch à O.25 l/be - Estil auper à O.25 l/be

## DESHERBAGE EN POST-LEVEE DU COLZA

Les différents herbicides utilisables ont essentiellement une action contre les graminées. Seul KERB-ULTRA montre une certaine efficacité sur dicotylédones, notamment une action limitante intéressante sur sanves et ravenelles.

matière active	Spécialité commerciale	Dose/Ha de spécialité	Observations
Dalapon	DOWPON ) DALAPHYT ) SPICA 10 )	2,5 kg.	<ul> <li>A partir du stade 2 F vraies du colza</li> <li>Traiter au plus tard 15 jours avant la date moyenne des gelées (risque de sensibiliser le colza au froid)</li> <li>Action ESSENTIELLEMENT SUR GRAMINEES</li> </ul>
carbétamide	LE GURAME PM	3 kg 5 à 6 kg	<ul> <li>Depuis le stade 4 F vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation.</li> <li>Application possible sur sol gelé</li> <li>BONNE ACTION SUR GRAMINEES  Insuffisant sur dicotylédones contre chiendent de novembre à fin janvier</li> </ul>
propyzamide	KERB 50 W	1,5 kg	<ul> <li>A partir du stade 3 F vraies du colza (B3) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation</li> <li>Application possible sur sol gelé</li> <li>BONNE ACTION SUR GRAMINEES</li> </ul> contre chiendent
		J kg	· Insuffisant sur dicotylédones
propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	<ul> <li>A partir du stade 4 F vraies bien développées du colza (6ème feuille naissante)</li> <li>Traiter de préférence avant l'hiver sur colza bien implanté et sain</li> <li>BONNE ACTION SUR GRAMINEES</li> <li>ACTION LIMITANTE SUR SANVES, RAVENELLES</li> </ul>
alloxydine- sodium .	FERVIN	1 kg 1,0 à 1,2 + 3 l hu	• Quel que soit le stade du colza • de la levée jusqu'au stade début montaison des graminées • Application de préférence sur végétation active (par temps poussant) • ACTION ESSENTIELLEMENT SUR GRAMINEES (sauf Paturin) 5 kg

732